



のびのび

No.103



2011年12月1日発行

発行所:医療法人ふるかわ医院

〒619-0221

京都府木津川市吐師宮ノ前 15-18

Tel/0774-75-2650 fax/0774-75-2651

予約専用電話 ☎0774-75-2652

<http://www.furukawa-iin.jp>

アレルギー学会に参加


11月12日の一日だけですが、東京でのアレルギー学会に参加しました。

小児喘息治療におけるネブライザー療法の果たす役割について、勉強してきました。

吸入ステロイド薬の登場で、小児気管支喘息の治療がとてもしやすくなりました。入院する子が減って、外来で治療や管理が出来るようになりました。

しかし、現実にはコントロール不十分の喘息患者が多く、中学生喘息児の70%以上が運動時に喘鳴や呼吸困難を経験しています。「吸入は、ほぼできている」と答えていても、適切に吸入できていない子どもが多いのも事実です。

外来で、もう一度吸入手技の見直しをしていこうと思います。



感染性胃腸炎

感染性胃腸炎とは、嘔吐・吐き気・下痢・腹痛などの胃腸症状を主とする感染症です。熱をとまうことともあります。引き起こす原因は色々ありますが、ウイルス性や細菌性のものがあります。細菌性胃腸炎はO-157やサルモネラなどが原因で特に夏場、食中毒など引き起こします。ウイルス性腸炎はロタウイルスやノロウイルスなどが代表され冬場に引き起こしやすいです。

くりかえし吐いて水分が摂れない時、脱水症状がみられる時は点滴による治療が必要になります。

吐いたものや唾液、便からも感染しますので吐いたものやオムツの取り扱いには十分気をつけましょう。食べ残しも食べないよう気をつけてください。

汚染された衣類は家庭用ハイターなど使用して洗濯してください。

ロタリックス



生後 20 週を過ぎると
2 回目が飲めません。

前々回の『のびのび』でもお知らせしましたがロタウイルス胃腸炎に対する新ワクチン(ロタリックス)が発売されています。経口(飲む)ワクチンで、生後6週~24週までに最低4週間あけて2回接種します。当院では1回1万4千円になります。御希望の方はご相談下さい。

MRワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン)を忘れないで受けましょう!!

1歳のお誕生日がきたら! 就学前のお子さん(年長さん)! 中学1年生の人! 高校3年生の人!
この方たちは無料でワクチン接種できます。詳細は受け付け窓口まで!!